

Diosmektit prášek

1. Identifikace, složení a účel zdravotnického prostředku

1.1 Popis a návod k použití

TAMMEX FAMILY je jednorázový zdravotnický prostředek v prášku pro okamžitou přípravu orální suspenze určené k perorální léčbě akutního a chronického průjmu a bolestivých symptomů v souvislosti s poruchami trávicího traktu.

1.2 Mechanismus účinku

Diosmektit je přírodní jíl, který se vyznačuje strukturou jemných, překrývajících se krystalických lamel s vysokou absorpční schopností, které pohlcují tekutiny ze střeva, zvyšují konzistenci stolice a zpomalují vyprazdňování. Absorpční schopnost diosmektitu také umožňuje reakci přípravku TAMMEX FAMILY s glykoproteiny ve sliznici pokrývající gastroduodenální stěnu, která změní jejich fyzikální vlastnosti tak, aby se vytvořil ochranný gel proti hypersekreci kyseliny a proti látkám narušujícím žaludeční stěnu.

2. Složení

Jeden sáček TAMMEX FAMILY obsahuje:

Diosmektit 3 g

Pomocné látky: aroma pomeranč, kyselina citrónová, oxid křemičitý, acesulfam K, sukralóza

3. Velikost balení

Balení obsahuje 10 sáčků na jedno použití o hmotnosti 3,25 g.

4. Návod k použití

Dospělí: 1 sáček na 100 ml tekutiny, 3 krát denně

Děti > 6 let věku: 2-3 sáčky denně

Děti > 1 roku: 1-2 sáčky denně

Před podáním přípravku dětem, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Každý sáček musí být po otevření použit pouze jednou. Rozpusťte obsah každého sáčku ve sklenici vody nebo jiné tekutiny.

Malým dětem lze obsah sáčku rozpustit v kojenecké láhvi v 50 ml vody, nebo smíchat s jiným nápojem a rozdělit do 2-3 denních dávek. Přípravek TAMMEX FAMILY lze také rozpustit v polotuhé potravě.

Abyste získali homogenní suspenzi, nasypte prášek pomalu do tekutiny a dobře promíchejte.

Přípravek TAMMEX FAMILY je vhodné konzumovat mezi jídly.

U dětí musí být léčba akutního průjmu doplněna včasným podáním perorálního rehydratačního roztoku, aby se zabránilo dehydrataci.

U dospělých je v případě nutnosti vhodné konzumovat perorální rehydratační roztok během léčby přípravkem TAMMEX FAMILY, aby se zajistila správná hydratace organismu.

5. Známé nežádoucí účinky

Nejsou známy žádné vedlejší účinky spojené s dlouhodobým užíváním tohoto přípravku. V případě předávkování se může objevit zácpa. V případě výskytu nežádoucích účinků odlišných od těch, které jsou uvedeny, se obraťte na svého lékaře.

6. Varování a bezpečnostní opatření

- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte déle než 10 po sobě následujících dnů. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem.
- Pokud průjem u dětí přetrvává déle než 3 dny, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Neužívejte přípravek TAMMEX FAMILY vleže.
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabici a na sáčku.
- Nepoužívejte, je-li obal poškozen.
- Každý sáček je určen k jednorázovému použití a je třeba jej otevřít až těsně před použitím: nepoužívejte částečně spotřebované sáčky, protože takový způsob použití může představovat rizika, jako je neúčinnost roztoku nebo kontaminace přípravku.
- Nepřekračujte doporučenou dávku, v případě výskytu nežádoucích účinků (zácpa, bolesti ve střevech, plynatost) přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.
- V případě výskytu neočekávaných nežádoucích účinků odlišných od těch, které jsou uvedeny, se poraďte s lékařem.
- Nepoužívejte v případě žaludečních nebo střevních lézí, chronické zácpy, podráždění nebo ucpání střev.
- Zdravotnický prostředek obsahuje hliník pocházející z diosmektitu. Pokud používáte další produkty nebo léky obsahující diosmektit jíl nebo sloučeniny hliníku, poraďte se svým lékařem předtím, než začnete tekutý diosmektit užívat.
- Neužívejte přípravek TAMMEX FAMILY, pokud užíváte jiné přípravky nebo perorální léky: absorpční účinek diosmektitu může nepříznivě ovlivnit jejich účinnost. V případě současného užívání jiných léků se před užíváním přípravku TAMMEX FAMILY poraďte se svým lékařem.

7. Kontraindikace a omezení užívání

Přípravek není vhodný pro děti do 1 roku.

Neužívejte přípravek TAMMEX FAMILY, pokud jste precitlivělý/á na některou z jeho složek. Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud jste těhotná nebo kojíte.

8. Uchovávání

Neužívejte přípravek TAMMEX FAMILY po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Skladujte přípravek při pokojové teplotě (max. 25 °C), nevystavujte přímému zdroji světla, tepla a nadměrné vlhkosti, zabraňte kontaktu s vodou. Datum expirace na obalu se vztahuje k přípravku v neotevřeném obalu a řádně skladovaném

9. Likvidace

Zlikvidujte přípravek podle předpisů stanovených místním úřadem. Nevyhazujte výrobek nebo jeho obal do přírody.



Unit 619B , IDA Industrial Estate
Northern Extension
Waterford, Ireland.

WALMARK®

Distributor: Walmark, a.s., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Česká republika
Držitel licence: DH – NORM s.r.o.



25 °C

CE 0426

Poslední revize: únor 2015

PK 1004-04
CF 6855/L/02/CZE